

使用上の注意

- 1) バイアグラ・レビトラ・シアリス錠は他人に譲渡・無償提供しないでください。
- 2) バイアグラ・レビトラ・シアリス錠を処方量より多く服用しないでください。
- 3) バイアグラ・レビトラ・シアリス錠服用後、24 時間以内に他のバイアグラ・レビトラ・シアリス錠を服用しないでください。

- 4) バイアグラ錠は性行為の 1 時間前に服用してください。空腹時に服用した方が効果的です。
- 5) レビトラ・シアリス錠は性行為の 1 時間前に服用してください。どちらの薬も食事の影響はうけにくいので、空腹時でなくてもかまいません。
- 6) バイアグラ・レビトラ・シアリス錠の使用後は高い所での作業、自動車や機械の運転操作は避けてください。
- 7) 副作用として、顔のほてり、頭痛、鼻づまり、消化不良、はきけ、動悸、物が青く見えたりまぶしく見える、等があります。またこれ以外にも副作用が出ることもありますので、服用後に何か異常を感じたら直ちに病院に連絡してください。
- 8) バイアグラ・レビトラ・シアリス錠は精力増強剤ではありません。興味本位で本剤を使うべきではありません。使い続けると本剤なしには勃起できなくなる可能性があります。
- 9) バイアグラ・レビトラ・シアリス錠に性感染症を防ぐ効果はありません。
- 10) バイアグラ・レビトラ・シアリス錠服用後に 4 時間以上勃起が続く場合は、すぐに医師の診察を受けてください。陰茎損傷の危険があります。

- 11) 他院で処方されている薬、注射薬はすべて医師に知らせてください。また追加もしくは変更になった場合もすぐ医師に知らせてください。
- 12) 定期的に内服している薬剤がある場合は、そちらの医師にバイアグラ・レビトラ・シアリス錠を服用していることを知らせてください。
- 13) 新しい薬の処方または注射を受ける場合は、そちらの医師にバイアグラ・レビトラ・シアリス錠を服用していることを知らせてください。
- 14) 危険防止のため、バイアグラ・レビトラ・シアリス錠を服用していることをパートナーまたは家族に知らせてください。
- 15) 救急の場合にもバイアグラ・レビトラ・シアリス錠を服用していることを必ず関係者に知らせてください。

- 16) 糖尿病、高血圧、心疾患がある場合、バイアグラ・レビトラ・シアリス錠を服用するのは危険です。
- 17) 降圧剤、亜硝酸剤、血小板凝集抑制剤とバイアグラ・レビトラ・シアリス錠の併用は危険です。

- 18) 勃起に関与する血管や神経に大きな障害がある場合や、ストレス等で大脳の性中枢に興奮がおきない場合には効果は期待できません。
- 19) 医師の指示に従って定期的に健康診断を受け、心臓や血圧に異常がないことを確認してください。

- 20) 使用上の注意を受領しました。

承諾書

私が貴院において処方を受けるに当たり、担当医からその内容について説明を受け十分に理解しました。

私は上記の項目を遵守します。

令和 年 月 日

氏名: _____ 印

携帯電話 _____

住所: _____